

Medax[®] Max UUSI

UUTTA KEMIAA VILJOJEN KASVUNSÄÄTEISSÄ

- Nopeasti toimiva & pitkä vaikutteinen
- Luotettava
- Joustava



 **BASF**

We create chemistry

Medax® Max

UUSI

Askeleen edellä olevaa uutta kemialla viljojen kasvunsäätöön

- Kaikille viljalajeille tehokas ratkaisu
- Aikaisiin ja myöhäisiin käsittelyihin joustavalla ajoituksella
- Nopea ja pitkäkestoinen vaikutus kahden tehoaineen seoksena
- Hyvät tankkiseosmahdollisuudet, myös hukkakauran torjunnassa

Ominaisuudet:

Medax Max on sisältää uutta kemialla viljojen laon torjuntaan ja kasvustorjentaan hallintaan. Tehokas vaikutus perustuu ensisijaisesti proheksadioni-kalsium tehoaineeseen, joka vaikuttaa aktiivisesti kasvissa heti käsittelyn jälkeen. Teho saadaan hyvin joustavasti erilaisissakin olosuhteissa. Toisen täydentävän tehoaineen trineksapakki-etyylin vaikutus tulee esille hitaammin ja myöhemmin, antaen myöhempää kasvunsäädettä vaikutusta täydentäen tuotteen kokonaisvaltaista vaikutusta.



Käsittämätön



Medax Max

Aikainen käsittely stimuloi juuriston kasvua syvemmälle ja leveämmälle, mikä vähentää erityisesti juurilakoa ankkuroimalla kasvin paremmin sekä parantaa veden- ja ravinteidenottoa. Korrenkasvun alussa tehty käsittely lyhentää tehokkaimmin alimpia solmuvälejä ja kasvattaa korsien halkaisijaa sekä soluseinämien paksuutta. Korrenkasvun aikana tehty käsittely lyhentää aktiivisesti kasvussa olevia solmuvälejä, tasaa versojen kehitystä sekä parantaa juuriston kehitystä. Käsittelyn ansiosta kasvusto on selvästi jäykempi ja kimmoisampi palautumaan pystyasentoon tuulen ja sateiden vaikutuksesta.

Myöhäisellä käsittelyllä vahvistetaan ja lyhennetään viimeisenä kasvussa olevia ylimpiä solmuvälejä, jolloin saadaan pidettyä painopiste alempana kasvusto paremmin pystyssä.

Vaikutustapa:

Medax® Max vaikutustapa - kaksi tehoainetta toimii yhdessä

	Proheksadioni kalsium	Trineksapakki-etyyli
Vaikutuksen alkaminen	Välittömästi	Saattaa alkaa myöhemmin (tarvitsee metabolisen aktivoinnin)
Vaikutuksen kesto	Arviolta 25 - 30 päivää	Arviolta 30 - 35 päivää
Merkitys	Nopea vaikutus alempiin solmuväleihin. Joustava käytettä	Vähemmän vaikutusta alempiin solmuväleihin, mutta lyhentää ylempiä

Käytössä huomioitavaa:

Optimaalinen ajankohta käsittelyllä on aamuaringossa ilmansuhteellisen kosteuden ollessa korkea ja lehdet kuivat. Tee käsittely lämpötilan ollessa väh. +7°C ja nousussa, korkeintaan +24°C lämpötilassa.

Käytön rajoitukset:

Jaettujen käsittelyiden vähimmäisväli on 7pv. Älä ruiskuta korkeissa lämpötiloissa keskellä päivää.

Vesimäärä:

100 - 400 l/ha

Sateenkesto:

1 tunti

Tehoaineet:

Proheksadioni-kalsium 50 g/kg
Trineksapakki-etyyli 75g/kg

Pakkausko / tukkupakkaus:

6 kg / 2 kpl



Käsittämätön

Medax Max

Kasvi	Ajankohta / kasvuaste BBCH	Annos kg/ka
Kevätohra	Pensomisen loppu – lippulehtivaihe, BBCH: 29-39	0,3 - 0,5
Kevätkaura	Pensomisen loppu – 4. solmuaste, BBCH: 29-34	0,3 - 0,5
Kevätvehnä	Pensomisen loppu – lippulehtivaihe, BBCH: 29-39 5. solmuaste - lippulehtivaihe, BBCH: 35-39	0,3 - 0,5 0,3
Syysvehnä	Pensomisen loppu – lippulehtivaihe, BBCH: 29-39 Lippulehti. - ensimmäiset vihneet, BBCH: 39-49 Jaettu käsittely kasvukauden max. annos:	0,3 - 0,75 0,3 - 0,5 1,0
Syysruis	Pensomisen loppu – lippulehtivaihe, BBCH: 29-39 Lippulehti. - ensimmäiset vihneet, BBCH: 39-49 Jaettu käsittely kasvukauden max. annos:	0,5 - 1,0 0,5 - 0,75 1,5
Ruisvehnä	Pensomisen loppu – lippulehtivaihe, BBCH: 29-39 Lippulehti. - ensimmäiset vihneet, BBCH: 39-49 Jaettu käsittely kasvukauden max. annos:	0,3 - 0,75 0,5 1,0
Syysohra	Pensomisen loppu – lippulehtivaihe, BBCH: 29-39 Lippulehti. - ensimmäiset vihneet, BBCH: 39-49 Jaettu käsittely kasvukauden max. annos:	0,5 - 1,0 0,5 - 0,75 1,5
Syyssaura	Pensomisen loppu – lippulehtivaihe, BBCH: 29-39	0,3 - 0,75